

Куда нужно обращаться жителям Новосибирска?

В филиалах Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы

Ленинский, Кировский районы
Туберкулёзная больница № 2:
ул. 2-я Станционная, 48

**Центральный, Железнодорожный,
Задельцовский районы**
Туберкулёзная больница № 3: ул. Вавилова, 14а


Что такое туберкулёз?

Туберкулёз – это инфекционное заболевание, причиной развития которого является микобактерия туберкулёза, или палочка Коха. Чаще всего наблюдается поражение легких, реже затрагиваются другие органы и системы.

Как происходит заражение?

Инфицирование может происходить различными путями:

- ❶ Воздушно-капельным путем – от больного активной формой туберкулеза, когда он чихает или кашляет.
 - ❷ Воздушно-пылевым – при попадании в организм человека высохших частиц мокроты больного вместе с пылью.
 - ❸ Контактным – через предметы быта.
 - ❹ Пищевым – при употреблении в пищу молочных продуктов от больных туберкулёзом животных.
- Без соответствующего лечения человек, болевой активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек.



ГУЗ
НСО ГОНКТБ

Департамент
по здравоохранению
города Новосибирска

Министерство
здравоохранения
Новосибирской области

Государственная областная
Новосибирская клиническая
туберкулезная больница

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТУБЕРКУЛЁЗЕ



Факторы риска заболевания:

- К ним относятся:
- Наличие контакта с больными туберкулезом людьми или животными;
 - Неудовлетворительные условия труда и быта;
 - Неполноточенное питание;
 - Хронический стресс;
 - Алкоголизм;
 - Табакокурение;
 - Наркомания;
 - ВИЧ-инфицированность;
 - Туберкулёт в анамнезе;
 - Наличие сопутствующих заболеваний.

Как проявляется туберкулез?

Заболевание наступает не сразу: от заражения до проявления болезни может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Часто в начале развития болезни признаки туберкулёза напоминают простудное заболевание. У человека могут появиться:

■ продолжительный кашель с выделением мокроты, возможно с кровью;

■ потеря аппетита;

■ потеря веса;

■ чувство усталости и слабости;

■ температурные колебания некоторого времени;

■ потливость по ночам;

■ одышка даже при небольших физических нагрузках.

Что делать при подозрении на туберкулез?

При сохранении в течение трёх недель хотя бы одного из перечисленных симптомов необходимо срочно обратиться к терапевту. Врач назначит обследование: рентген грудной клетки и исследование мокроты. Во всех подозрительных случаях пациента направляют в противотуберкулёзное медицинское учреждение для дополнительной диагностики и лечения.



Сопутствующие заболевания, способствующие развитию туберкулёза:

- иммунодефицитные состояния, в т. ч. ВИЧ;
- хронические заболевания легких;
- сахарный диабет;
- гипертония;
- язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки;
- хронические заболевания мочеполовой системы.

Как проходит лечение туберкулёза?

Большинство случаев туберкулеза излечимо при условии строгого соблюдения всех рекомендаций врача.

Продолжительность лечения зависит от вида и стадии заболевания и может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. Лечение состоит из 2-х фаз – интенсивной и фазы продолжения.

Самостоятельное прекращение приема лекарств приводит к обострению или дальнейшему развитию болезни. Это может привести к возникновению тяжелых осложнений, и даже к летальному исходу.

Для иностранных граждан обследование и лечение туберкулёза на территории России проводится на договорной основе (Постановление Правительства РФ от 6 марта 2013г. №186).